

Acute cholecystitis?

Neem voor iedere patiënt contact op met de studietoördinator:
24 uur per dag/ 7 dagen per week

1. Cholecystitis telefoon: 06-15693636 (studietoördinator)
2. D. Boerma: 06-41291403 (hoofdonderzoeker)

PEANUTS II TRIAL

The use of PErioperative ANtibiotic prophylaxis in the treatment of acUTE cholecystitis

Inclusie

- Milde of matig-ernstige acute calculeuze cholecystitis
- Cholecystectomie
- Ondertekend informed consent

Exclusie

- Ernstige acute calculeuze cholecystitis
- Leeftijd <18 jaar
- Reeds antibiotische behandeling vóór diagnose
- Bewezen allergie voor kefzol
- Zwangerschap



www.cholecystitis.nl

Ernst van de cholecystitis (Tokyo richtlijnen)

Ernstige (graad III) acute cholecystitis

Er sprake is van tenminste één van de volgende criteria:

1. Cardiovasculaire dysfunctie (hypotensie welke behandeld moet worden met dopamine of noradrenaline)
2. Neurologische dysfunctie (afname van het bewustzijn)
3. Respiratoire dysfunctie ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ ratio < 300)
4. Renale dysfunctie (oligurie; creatinine $> 177 \text{ mol/l}$)
5. Hepatische dysfunctie (PT-INR $> 1,5$)
6. Hematologische dysfunctie (trombocytenaantal $< 100 \times 10^3/\text{mm}^3$)

Matig-ernstige (graad II) acute cholecystitis

Er is sprake van tenminste één van de volgende criteria:

1. Leukocytose ($> 18 \times 10^3$ cellen/ mm^3)
2. Palpabele, gevoelige weerstand in het rechter boven kwadrant
3. Duur klachten > 72 uur
4. Evidente lokale ontsteking (biliaire peritonitis, pericholecystisch abces, hepatisch abces, gangreneuze cholecystitis, emfysemateuze cholecystitis)

Milde (graad I) acute cholecystitis

Afwezigheid van de criteria voor een ernstige of matig-ernstige acute cholecystitis

